

RECOMENDACIONES DE ORTODONCIA

Siempre es bueno tener presente que:

- El tratamiento de ortodoncia pretende mejorar la posición de los dientes y la oclusión con el fin de dar estética dentaria y facial y al mismo tiempo proteger los dientes, las encías, el hueso de soporte y las articulaciones temporomandibulares.
- El tratamiento temprano (primera fase) no tiene como propósito evitar la segunda fase de tratamiento cuando todos los dientes estén en boca.
- El éxito del tratamiento de ortodoncia y su duración depende en un alto porcentaje de la colaboración del paciente, por lo que es necesario seguir las indicaciones dadas por el ortodoncista junto con asistir a las horas asignadas, para así obtener una adecuada evolución del tratamiento en los plazos acordados.
- El tratamiento se atrasa cada vez que el paciente no asiste a sus controles, rompe un aparato o cada vez que un bracket o banda se descementa.
- Es esencial una excelente higiene bucal durante todo el tratamiento. Si esto no se cumple, se puede generar mal aliento, caries, manchas en las piezas dentarias e inflamación de las encías.
- Los aparatos de ortodoncia sean fijos o removibles requieren de un cuidado especial para evitar su deformación o ruptura. El paciente deberá tener el cuidado necesario para que los aparatos permanezcan en buen estado (no morder lápices, mondadientes, pinches, comerse las uñas, etc)
- Durante el tratamiento de ortodoncia y de contención el paciente tiene prohibido comer alimentos pegajosos (chicles, calugas, masticables, etc) y alimentos duros (dulces, papas fritas, turrón, cabritas, frutos secos, tostadas y frutas a mordiscos) ya que éstos podrían provocar el descementado y/o deformación de los aparatos de ortodoncia y de contención.
- Si el paciente deforma o rompe los aparatos, el tratamiento se atrasa y el paciente deberá cancelar el costo de dichos aparatos o su reposición.
- Es posible que durante el tratamiento de ortodoncia se necesite un aditamento adicional (microtornillo, barra palatina, botón de nance, etc), esto será informado cuando sea necesario y su costo es aparte.
- Es posible que el paciente presente discrepancia de Bolton que es una alteración de tamaño dentario, de ser así una vez finalizado el tratamiento necesitará ensanchar algunas piezas dentarias.
- Cuando se retiran los aparatos fijos, el paciente deberá utilizar, por un cierto tiempo, una contención con el fin de mantener la posición dentaria obtenida en el tratamiento. Esta etapa de tratamiento tiene un costo aparte.

- Existen posibles riesgos, dificultades y efectos no deseados como consecuencia de un tratamiento de ortodoncia, incluso si la posibilidad de éstos sean muy bajas, estos son:
 - Reabsorción radicular: Este problema muchas veces es de carácter no predecible y ocurre por razones desconocidas. Controles radiográficos anuales pueden ser solicitados para determinar si esta situación está sucediendo.
 - Problemas articulares: Si bien el tratamiento de ortodoncia en lo posible pretende tratar la dentición para aliviar problemas articulares, no se puede asegurar que no se produzcan fenómenos de reabsorción o mal funcionamiento articular. Esto especialmente en pacientes con patología articular previa, hiperlaxitud ligamentaria y de género femenino.
 - Sensibilidad dentaria: esta condición ocurre con relativa frecuencia. Es el resultado del movimiento de las piezas dentarias y por ende constituye una respuesta normal de los tejidos.
 - Bruxismo: es normal que el paciente presente bruxismo durante el tratamiento de ortodoncia por los cambios continuos en la mordida, si éste continúa después del retiro de aparatos es posible que requiera utilizar un plano nocturno. Esto tiene un costo aparte.

Sucursal Santiago Centro.

- Fono: +569 2633 9152
- Fono: +562 2664 0959



+569 7777 8336

Sucursal Puente Alto

- Fono: +562 2904 7633
- Fono: +562 2904 7634



+569 4452 2056