

Toallitas húmedas

Con Eumulgin® VL 75

SC-DE-19-008-8

| Fase | Ingrediente / Marca | INCI | (%) | Función |
|------|-----------------------------|--|-------|--------------------|
| A | Agua | Water | 94.90 | Agua |
| | Rheocare® XGN | Xanthan Gum | 0.10 | Estabilizador |
| B | Eumulgin® VL 75 | Lauryl Glucoside, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Glycerin | 3.00 | Emulsionante (O/A) |
| | Cegesoft® C 24 | Ethylhexyl Palmitate | 0.30 | Emoliente |
| | Protectol® PE | Phenoxyethanol | 1.00 | Preservante |
| | Fragancia | Fragrance | 0.10 | Fragancia |
| C | Benzoato de Sodio | Sodium Benzoate | 0.50 | Preservante |
| | Ácido Cítrico (50% sol.) | Citric Acid | 0.10 | Regulador de pH |

Especificación

| | |
|---|------------|
| Valor del pH (23°C) | 4.9 - 5.1 |
| Viscosidad (Brookfield; RVF; spindle 4; 10 rpm; 23°C) | <200 mPa s |

Desempeño

Ningún desempeño adicional fue medido.

Proceso de producción

Proceso en frío.

Fase A: primero adicione agua a un recipiente, después adicione Rheocare® XGN y mezcle hasta que esté completamente disuelto.

En paralelo, mezcle todos los componentes de la Fase B hasta que quede homogéneo. Enseguida, adiciónelo a la fase A bajo agitación.

Finalmente, adicione el Benzoato de Sodio y ajuste el valor del pH para 4,9 - 5,1.